

Θεσσαλονίκη
14/6/2025

Η εταιρεία Βιτσαρόπουλος ΑΕ σας προσκαλεί
σε **study club** οστικών αναπλάσεων με θέματα:

**ΜΕΤΕΞΑΚΤΙΚΟ ΦΑΤΝΙΟ,
ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ.
Από την πρόληψη στην άμεση τοποθέτηση κι αποκατάσταση.**

**ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ
ΟΠΙΣΘΙΑ ΑΚΡΟΛΟΦΙΑ ΤΗΣ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΥ.**

ΟΜΙΛΗΤΕΣ:



Δημήτρης ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ



Δημήτρης ΚΑΡΑΣΟΥΛΟΣ



Ξενοδοχείο MEDITERRANEAN PALACE ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Σαλαμίνος 3 & Καρατάσου, 54626 Θεσσαλονίκη

Η ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΟΥΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ



Δημήτρης ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ

Ο Δημήτρης Νικολιδάκης γεννήθηκε το 1973 στο Ηράκλειο. Οι ανώτατες σπουδές του περιλαμβάνουν πτυχίο στην Βιολογία από το Πανεπιστήμιο Κρήτης (1991-1995), πτυχίο Οδοντιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1995-2000), μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Περιοδοντολογία από το Πανεπιστήμιο UMC St Radboud Nijmegen Ολλανδίας (2002-2005) και διδακτορικό δίπλωμα στην Εμφυτευματολογία από το ίδιο Πανεπιστήμιο UMC St Radboud Nijmegen Ολλανδίας (2005-2009).

Απέκτησε κλινική εμπειρία αρχικά ασκούμενος στην χειρουργική στόματος στο Οδοντιατρικό τμήμα του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (2000-2002), ενώ στη συνέχεια εργάστηκε ως περιοδοντολόγος - εμφυτευματολόγος σε διάφορα οδοντιατρικά ιδιωτικά κέντρα στην Ολλανδία (2003- 2008). Από τον Οκτώβρη του 2008 έως σήμερα, ασκεί αποκλειστικά την περιοδοντολογία και εμφυτευματολογία στο ιδιωτικό του ιατρείο στο Ηράκλειο Κρήτης.

Διαθέτει διδακτική εμπειρία καθώς εργάστηκε ως κλινικός καθηγητής τόσο στο προπτυχιακό όσο και στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του πανεπιστημίου UMC St Radboud Nijmegen Ολλανδίας από το 2004 έως το 2008. Από το 2011 έως το 2016, συμμετείχε στην διδακτική ομάδα της ΙΤΙ Ελλάδος (Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Εμφυτευματολογίας).

Ταυτόχρονα είναι ενεργός ερευνητής στους τομείς της εμφυτευματολογίας, των βιοϋλικών και της ιστικής αναγέννησης καθώς έχει δημοσιεύσει μέχρι σήμερα πάνω από 25 επιστημονικά άρθρα σε αναγνωρισμένα διεθνή οδοντιατρικά περιοδικά διαθέσιμα μέσω του PubMed-Medline και διατηρεί συνεργασία με το τμήμα της Περιοδοντολογίας στο Πανεπιστήμιο της Βέρνης στην Ελβετία.

Τέλος, πραγματοποιεί συχνά διαλέξεις σε τοπικά ή διεθνή συνέδρια και επιμορφωτικά σεμινάρια, ενώ όσο αφορά άλλες επιστημονικές δραστηριότητες του είναι μέλος επιτροπής κριτών σε ευρωπαϊκά περιοδικά, ITI Fellow από 2012, registered ITI Speaker.



Δημήτρης ΚΑΡΑΣΟΥΛΟΣ

Ο Δημήτρης Καρασούλος σπούδασε στην Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών από όπου και έλαβε το πτυχίο του το 2005.

Το 2010 ολοκλήρωσε με αριστεία το μεταπτυχιακό πρόγραμμα (Master of Science) εξειδίκευσης στην Οδοντική Εμφυτευματολογία στο Πανεπιστήμιο του Manchester της Βρετανίας, με Διευθυντή προγράμματος τον διεθνούς φήμης ερευνητή Marco Esposito.

Η διπλωματική του εργασία με τίτλο " Interventions for replacing missing teeth: augmentation procedures of the maxillary sinus." δημοσιεύθηκε στο Cochrane Collaboration και στο διεθνώς καταξιωμένο επιστημονικό περιοδικό European Journal of Oral Implantology.

Επίσης προσφάτως η μελέτη σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών όσο αφορά τις επιφάνειες εμφυτευμάτων με τίτλο «Is galvanic corrosion between implant abutments and roots a possible scenario? An experimental study under simulated healthy and inflammatory peri-implant conditions and F anions» δημοσιεύθηκε στο διεθνές έγκριτο επιστημονικό περιοδικό Dental Materials.

Δίνει διαλέξεις περί της Οδοντικής Εμφυτευματολογίας και ιδιαίτερα όσον αφορά τη διαχείριση μαλακών και σκληρών ιστών, την αλληλεπίδρασή τους με το γενικότερο σχεδιασμό των οδοντικών εμφυτευμάτων, όπως επίσης και στον τομέα της Ψηφιακά Καθοδηγούμενης Εμφυτευματολογίας.

Διατηρεί και διευθύνει την ιδιωτική του οδοντιατρική κλινική στη Γλυφάδα, όπου ασχολείται με τη χειρουργική των Οδοντικών Εμφυτευμάτων και την προσθετική τους αποκατάσταση.

Δημήτρης ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΟΠΙΣΘΙΑ ΑΚΡΟΛΟΦΙΑ ΤΗΣ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΥ

Περίληψη

Η χαμηλή οστική πυκνότητα και οι ελλειπείς καθ' ύψος ή κατά πλάτος διάστασης της φατνιακής ακρολοφίας αποτελούν πρόκληση για την τοποθέτηση εμφυτευμάτων σε νωδές περιοχές της οπίσθιας άνω γνάθου.

Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν κλινικά περιστατικά όπου το ύψος του υπολειπόμενου οστού προσμετράται σε λιγότερο από 8 χιλιοστά λόγω αύξησης του όγκου του ιγμόρειου άνδρου ή/και εκτεταμένης οστικής απορρόφησης μετά την εξαγωγή δοντιών στην οπίσθια περιοχή της άνω γνάθου, μην επιτρέποντας τη χρήση συννηθισμένου μεγέθους εμφυτευμάτων με την κλασσική τεχνική.

Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορούν να ληφθούν υπόψη διαφορετικές χειρουργικές επιλογές επιτρέποντας τη κατάρτιση ενός σχεδίου θεραπείας για προσθετική αποκατάσταση με εφαρμογή εμφυτευμάτων. Τέτοιες επιλογές, για παράδειγμα, είναι η κλειστή ανύψωση του εδάφους του ιγμορείου σε συνδυασμό με τη χρήση ειδικών εργαλείων, η ταυτόχρονη ή καθυστερημένη ανοικτή ανύψωση ιγμορείου ή η χρήση κοντών (< 8 χιλιοστά) και πολύ κοντών (< 6 χιλιοστά) εμφυτευμάτων.

Δημήτρης ΚΑΡΑΣΟΥΛΟΣ

ΜΕΤΕΞΑΚΤΙΚΟ ΦΑΤΝΙΟ, ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.

Περίληψη

Κατά τη διάρκεια της επούλωσης του φατνίου η περιοχή θα υποστεί σημαντική τρισδιάστατη αλλοίωση κι αναδιαμόρφωση, η έκταση της οποίας που δε μπορεί να προβλεφθεί και μπορεί να ποικίλει. Το ίδιο και το ποσοστό νεύου οστού. Αυτά επηρεάζονται από συστηματικούς και τοπικούς ανατομικούς παράγοντες. Δεν είναι ασυνήθιστη μια οστική ανεπάρκεια, η οποία μπορεί να περιπλέξει την υποστήριξη του εμφυτεύματος, και τα προσθετικά στάδια, και ταυτόχρονα να αυξηθεί ο κίνδυνος πρώιμων και μεθύτερων επιπλοκών ή μιας αισθητικής αποτυχίας.

Με την τρέχουσα στροφή προς τα προσθετικά οδηγούμενα πρωτόκολλα τοποθέτησης, οι διαστάσεις κι η μορφολογία της μετεξακτικής περιοχής είναι σημαντική για τη χειρουργική τοποθέτηση και τα στάδια αποκατάστασης. Η κατά το δυνατόν διατήρηση του προ-εξαγωγής όγκου του οστικού υποβάθρου αλλά και των χαρακτηριστικών των μαλακών ιστών θεωρούνται απαραίτητα για την παροχή αισθητικής υποστήριξης εμφυτευμάτων αποκατάσταση με υγιείς περιεμφυτευματικούς ιστούς.

Μια ενδελεχής κατανόηση των βιολογικών αρχών που διέπουν την επούλωση του οστού και των μαλακών ιστών είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη προβλέψιμων αποτελεσμάτων. Η επιτυχής θεραπεία απαιτεί προσεκτική επίλογη προσέγγισης για κάθε περίπτωση, σχολαστικές χειρουργικές τεχνικές και κατάλληλη επιλογή υλικών.

ΩΡΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

09:15-9:30	Προσέλευση
09:30-11:00	Δημήτρης ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ
11:00-11:30	Διάλειμμα για καφέ
11:30-13:00	Δημήτρης ΚΑΡΑΣΟΥΛΟΣ - 1ο μέρος
13:00-13:30	Διάλειμμα για ελαφρύ γεύμα
13:30-14:30	Δημήτρης ΚΑΡΑΣΟΥΛΟΣ - 2ο μέρος



Gen-Os



Οστικό μόσχευμα
σε κόκκους,
με διατηρημένο
κολλαγόνο.



Αρχικός ιστός

Μείγμα σπογγώδους και φλοιώδους ετερόλογου οστού

Κολλαγόνο ιστού

Διατηρημένο

Φυσική φόρμα

Κόκκις ελαφρώς ακτινοσκιεροί

Μέγεθος κόκκου

Στάνταρ 250-1.000 μm

Χρόνος επανεισόδου

4/5 μήνες, εξαρτάται όμως από τα χαρακτηριστικά της περιοχής μεταμόσχευσης

Χαρακτηριστικά

Φυσική αναπαραγωγή του αυτόλογου οστού, το μόσχευμα **Gen-Os** διατηρεί τα ίδια ενδογενή χαρακτηριστικά (θεμέλια ουσία και πορώδη δομή) και εμφανίζει υψηλή οστεοαγωγικότητα. Είναι φυσικής προέλευσης και βιοσυμβατό όπως αποδεικνύεται από δοκιμασίες που έγιναν σύμφωνα με το πρότυπο ISO 10993 στο Università degli Studi di Torino.

Το μόσχευμα **Gen-Os** είναι απορροφήσιμο και υποστηρίζει την οστική ανάπτυξη διατηρώντας το αρχικό σχήμα και όγκο του μοσχεύματος (οστεοκαθοδήγηση). Επιπλέον, χάρη στο κολλαγόνο που περιέχει το προϊόν διευκολύνει το σχηματισμό θρόμβου και την επακόλουθη εισβολή κυττάρων επισύλωσης και ανάπτυξης τα οποία μέσα από τη διαδικασία υποκατάστασης και ενσωμάτωσης του μοσχεύματος, προάγουν την ανάπτυξη του ελλείποντος οστού

Κλινικές εφαρμογές

Χειρουργική στόματος, Περιοδοντολογία, Εμφυτευματολογία

GTO[®]



Έτοιμο προς χρήση, προενυδατωμένο βιοϊλικό, αναμειγμένο με το **OsteoBioI[®] TSV Gel** που του εξασφαλίζει ιδανική κολλώδη σύσταση.

Διατίθεται σε σύριγγα κι ενίεται κατευθείαν στην ελλειμματική περιοχή. Παρουσιάζει εξαιρετική σταθερότητα χάρη στο ιδανικό ιξώδες του.

Χαρακτηριστικά

Το **OsteoBioI[®] GTO[®]** είναι ένα ετερόλογο οστικό μόσχευμα. Είναι ένα μείγμα κολλαγονούχων κόκκων συμπαγούς και σπογγώδους οστού με κοκκομετρία που κυμαίνεται από 600 έως 1.000 μm, κατάλληλα αναμειγμένο με **OsteoBioI[®] TSV Gel** (μείγμα γέλης ετερόλογου, τύπου I και II κολλαγόνου με πολυακρόρεστα λιπαρά οξέα και ένα βιοσυμβατό συνθετικό συμπολυμερές, αραιωμένο σε οστικό διάλυμα).

Σύνθεση

-80% μείγμα οστικών κόκκων,

-20% **OsteoBioI[®] TSV Gel**

Χρόνος επανεισόδου

Περίπου 5 μήνες

Κλινικές εφαρμογές

Ανοικτή ανύψωση ιγμορείου, ενδοοστικά ελλείμματα, περιεμφυτευματικές βλάβες, οριζόντια αύξηση, αναγέννηση ακροφυσίας.



Vitsaropoulos
COMPLETE DENTAL SOLUTIONS